

درد شانه و پارگی تاندون
عضلات روتاتور کاف شانه:


تاندونهای شانه و روتاتور کاف به بلند کردن بازو،
چرخاندن آن و دستیابی به اشیا بالای سر کمک
میکنند.

این تاندونها از عضلات شانه منشا گرفته و با
اتصال به سر استخوان بازو آن را درون کاسه
شانه قرار میدهند. پارگی تاندون شانه باعث
بروز ضعف در شانه شده و فرد در فعالیتهایی
مانند شانه کردن موها و پوشیدن لباس درد
داشته وبا مشکل رو برو است. یکی از شایعترین
مشکلات میانسالی درد شانه است که منشا
اغلب این دردها پارگی تاندون شانه است. پارگی
این تاندونها در انواع مختلف رخ میدهد:
این تاندونها در

نیمه پارگی: پارگی های کوچک که بافت نرم را
کامل درگیر نکرده باشد.

پارگی کامل: در این نوع بافت نرم به دو بخش
 تقسیم میشود.

تاندون عضله روتاتور کاف



مرکز جامع توانبخشی امید

عوامل زیر میتوانند موجب بروز بیشتر این عارضه شوند:

با افزایش سن و بخصوص با انجام مکرر فعالیت
های بدنی خاص، خونرسانی به تاندون کم شده
و همین امر موجب ضعیف شدن تاندون
گردیده و موجب میشود تاندون راحت تر پاره
شود. با افزایش سن و کاهش خونرسانی به
تاندون توانایی آن در ترمیم هم کم میشود.
گاهی اوقات استخوان های اضافی که در سطح
زیرین زائده آکرومیون بوجود میاید موجب
فشار مداوم به تاندون شده و زمینه را برای
آسیب به آن فراهم میکند. پارگی روتاتور کاف
اگر درمان نشود به مرور زمان گسترش یافته و
بیشتر میشود. گرچه ممکن است این گسترش
در ظاهر بدون درد و علامت باشد.

مهمترین علائم این بیماری عبارتند از:

◆ درد شانه

◆ شدت درد شانه با بالا بردن دست بیشتر
میشود و بعد از مدتی بیمار به علت درد
نمیتواند دست را به بالای سرشن ببرد. در این
حال انجام بسیاری از فعالیت های روزمره
مانند شانه زدن سر مشکل میشود.

◆ ضعیف و لاغر شدن عضلات اطراف شانه

◆ ضعف دست وقتی میخواهیم دست را به
بالای سر ببریم

◆ صدا دادن شانه وقتی میخواهیم دست را
حرکت دهیم

علل اصلی پارگی این تاندونها عبارتند از:

آسیب و استفاده بیش از حد از حرکات تکراری

آسیب: اگر جسم سنگینی را به شکل ناگهانی
بلند کنید یا با بازوی باز روی زمین بیفتد
احتمال پارگی این تاندون وجود دارد. این نوع
پارگی امکان دارد با آسیبها دیگری همچون
در رفتگی شانه یا شکستگی همراه باشد.

استفاده بیش از حد: اغلب پارگی ها درنتیجه
فرسودگی تاندون به مرور زمان رخ میدهد که با
افزایش سن احتمال آن افزایش می یابد و
معمولا هم در اثر استفاده از حرکات مداوم و
تکراری شانه ایجاد می شود.

این پارگی در افراد بالای ۴۰ سال که ورزشهايی
با حرکات تکراری انجام میدهند یا شغل آنها با
استفاده دراز مدت از شانه همراه است اتفاق
میافتد. تنیس و وزنه برداری از جمله ورزشهايی
هستند که احتمال آسیب را بیشتر میکنند. در
زنان خانه دار که کارهای تکراری انجام میدهند
احتمال آسیب بالاست. در افراد جوان علت
اصلی پارگی تصادف و حادثه است.

درمان نوین **مرکز توانبخشی امید** برای این گروه از این بیماران تزریق گاز ازن به منظور ترمیم بافت آسیب دیده است. همچنین پزشکان این مرکز با رویکرد جامع نگر علاوه بر مفصل شانه ساختمانهای اطراف آن را هم بررسی میکنند ، به طور مثال درمان دستی فاستهای گردنی که ثانویه به پارگی تاندون شانه ایجاد میشوند میتوانند باعث درد گردن و محدودیت حرکتی شوند که آزادسازی گرفتگی ها با طب سوزنی و ماساژ نیز صورت میگیرد .



● مرکز جامع توانبخشی امید ● Omid Rehabilitation Clinic

۱. خیابان پاسداران. خیابان شهید کلاهدوز(دولت). دیباچی جنوبی. روبروی سنجابی تلفن: ۰۲۷۸۰۷۰۱-۲
۲. خیابان ولیعصر. نرسیده به استاد مطهری. کوچه افتخار شماره ۳۴. طبقه همکف تلفن: ۰۸۸۹۸۴۴۰-۴۱

واحد ارتقایی فنی
کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی
www.omidrehab.com
کلینیک تخصصی گمر
www.lumbar.ir
www.orped.com

درمان
هدف درمان کاهش درد و بازگرداندن عملکرد مناسب است .

در برنامه ریزی درمانی سن بیمار ، نوع فعالیت هایی که انجام میدهد و سلامت کلی و نوع پارگی مد نظر قرار میگیرند .

حدود ۵۰٪ بیماران با روش غیرجراحی بهبود می یابند .
استراحت : قدم اول انجام ندادن فعالیتهای بالای سر است .

دارو: مانند داروهای ضدالتهاب غیر استروییدی


تزریق استرویید: داروهای کورتیکوستروییدی درون محل پارگی به منظور کاهش التهاب و درد تزریق میگردد .

توانبخشی : توانبخشی شامل استفاده از مدادیته های مختلف فیزیوتراپی ، لیزر درمانی ، دیاترمی و تمرین درمانی است . این روش درمانی به کاهش علائم و تقویت عضلات اطراف کمربند شانه ای کمک می کند و مدت زمان زیادی هم میطلبد .



پارگی روتاتور کاف
مرکز جامع توانبخشی امید

همانطور که گفته شد، این علائم ممکن است بطور ناگهانی و بدنبال وارد شدن یک ضربه به شانه مثل افتادن روی شانه بوجود آید و یا ممکن است بطور مزمن و در طی یک زمان طولانی تر ایجاد شود .
در پارگی روتاتور کاف عمولاً در جلوی شانه است و ممکن است به بازو تیر بکشد . در ابتدا درد ممکن است خفیف بوده و فقط در حین بالا بردن دست ایجاد شود ولی بتدربیج بیشتر شده بطوریکه ممکن است درد در حین استراحت هم وجود داشته باشد و یا ممکن است شبها و قتی بیمار روی شانه مبتلا میخوابد ایجاد شود .



محل درد شانه در پارگی حضنه روتاتور کاف
مرکز جامع توانبخشی امید

تشخیص پارگی

تشخیص پارگی بر اساس معاينه و نشانه ها صورت میگیرد . معاينه دامنه حرکتی مفصل شانه در جهات مختلف اطلاعات بسیاری در مورد علت درد به پزشك میدهد . درد و ضعف ناشی از پارگی از فردی به فرد دیگر متفاوت است ، برخی افراد حتی باور نمیکنند پارگی تاندون شانه دارند .

تستهای دیگری که به تشخیص کمک میکنند شامل عکس رادیوگرافی است که گرچه پارگی را تشخیص نمی دهد اما میتوان مشکلات دیگر را با توجه به آن افتراق داد . ام آر ای و سونوگرافی تصاویر بهتری از بافت نرم میدهند بنابراین در این مورد معیارهای تشخیصی بهتری محسوب میشوند .